



FINITO



Imidaclopride 70 WG

→ DESCRIPTION :

FINITO WG est insecticide systémique à base d'**imidacloprid 70% WG** pour combattre plusieurs ravageurs sur différents cultures (Fruitiers, Agrumes, Grandes cultures, cultures maraîchères et cultures ornementales).

→ MODE D'ACTION :

FINITO WG est un insecticide de contact et d'ingestion. IL agit au niveau du système nerveux des insectes. Action systémique; le produit est absorbé par les feuilles, par les racines et partiellement par de fines écorces.

FINITO WG est totalement sélectif vis-à-vis des acariens prédateurs tels que *Typhlodromus pyri*, *Amblyseius spp*, et *Phytoseiulus persimilis*. IL peut être appliqué en lutte intégrée en pommes et en plantes ornementales.

FINITO WG se caractérise par:

- * Sa faible toxicité
- * Sa puissante systémie
- * Son large spectre d'action sur de nombreux insectes et sur diverses cultures.
- * Très longue durée d'action et rémanence.
- * Son large champ d'utilisation.
- * Sa compatibilité avec les culture traitées

Finito WG agit sur la plupart des insectes piqueurs suceurs tels que les pucerons, les mouches blanches, les cicadelles, les thrips (hormis *Frankliniella*). Il a un effet freinant vis à vis des microlépidoptères, diptères, Attise, etc.

→ TABLEAU D'USAGE :

Cultures	Ravageurs	Doses et modes d'application		D.A.R
		Doses	Modes	
Agrumes	Mineuses	15Gr/HL (foliaire)	Foliaire	21 Jours
Agrumes	Mineuses	1-2Gr/arbre (-4ans)	badigeonnage	21 Jours
Cultures sous serres	Mouche blanche	15Gr/HL	Foliaire	3 Jours
Pommiers, Agrumes	Pucerons	10Gr/HL	Foliaire	14 Jours
Vignes	Cicadelles	10Gr/HL	Foliaire	21 Jours
Cultures ornementales	Pucerons	10Gr/HL	Foliaire	21 Jours

→ REMARQUES:

Afin d'éviter l'apparition de résistance, il est conseillé d'alterner FINITO WG avec des insecticides de groupes chimiques différents.

Toxique pour abeilles, ne pas traiter pendant la floraison, y compris celle des mauvaises herbes. Avant le traitement, les mauvaises herbes en fleur doivent être fauchées, de façon à ce que les fleurs soient fanées lors de la pulvérisation et ne soient plus visitées par les abeilles.





فينتو®

ايميداكلوريباد WG 70

الخصائص :

الاستعمال و الجرعة :

الجرعة	الآفات	المحصول
15 غ/هـل	حافرات الأوراق	القوارص
15 غ/هـل	الذبابة البيضاء	الزراعات في البيوت المحمية
10 غ/هـل	الزيلي	أشجار التفاح و القوارص
10 غ/هـل	السيكادال	العنب
10 غ/هـل	الزيلي	نباتات الزينة

فينتو مبيد حشري جهازى يمتاز بفعالية عالية على العديد من الحشرات الضارة و خاصة حافرة الأوراق، الزيلي، الذبابة البيضاء في حقول القوارص و الأشجار المثمرة والخضروات.

طريقة التأثير

يؤثر فينتو باللمس و البلع على الجهاز العصبي للحشرات. يمتاز فينتو بتأثير ضروري و فعالية طويلة الأمد.

احتياطات الاستعمال :

تجنب ملامسة المبيد للجلد او العين. يجب ارتداء ملابس واقية و قفازات اثناء الرش. تجنب استنشاق رذاذ الرش و ابتلاع المسحوق. يمنع التدخين و الاكل و الشرب عند استعمال المبيد. يجب حفظ المبيد في عبوته الاصلية في مكان مغلق و جاف و مهواء و بعيدا عن المأكولات و الأعلاف و بعيدا عن تناول الأطفال. يجب تغيير الملابس و الإغتسال عند الانتهاء من الرش.

الإسعافات الأولية:

في حالة تناول المبيد عن طريق الفم او استنشاقه يجب الاتصال مباشرة بالطبيب. في حالة إصابة العين و تلوث الجلد يغسل جيدا بكمية كبيرة من الماء النظيف. عند الاستنشاق يحمل المصاب الي الهواء الطلق و استدعاء الطبيب في حالة صعوبة التنفس.



شركة الخضراء

شارع الطيب المهيري 5000 المنستير
الهاتف: 73 462 925 - 28 418 001
الفاكس: (216) 73 447 999
E-mail: ste.khadra@topnet.tn
site web: www.elkhadra.tn