



# CICLOPE<sup>®</sup> EC

Clodinafop - Propargyl 95 g/l + Cloquintocet-Mexyl 25g/l EC



## Propriétés et Mode D'action:

**CICLOPE EC:** est un herbicide anti-graminé sélectif des cultures des céréales. Il est efficace pour le contrôle des adventices graminées en post-emergence telles que: *Avena sp*, *Lolium sp*, *Phalaris spp*, *Alopecurus myosuroides* et *Poa trivialis*. Il se caractérise par son absorption rapide à travers les feuilles.

Le mode d'action de cet herbicide: inhibition de l'acétyl-coenzyme A carboxylase, Lorsqu'il inhibe la biosynthèse des lipides: «composants essentiels pour la formation des membranes cellulaires», ce qui conduit au blocage de la croissance des mauvaises herbes dans les 48 heures après l'application.

La sélectivité des cultures est basée sur la capacité des plantes à métaboliser le composé initial en acide libre et dérivés actifs. Le produit fonctionne mieux contre les herbes actives en croissance.

## Doses et usages homologues:

Cultures	Adventices	Doses	V. de bouillie
BLÉ (Tendre et Dur)	M. Herbes Graminées	500cc/ha	200 - 400L/ha
Nbre applications	Intervalle des applications	Stade des applications	D. A. R
1 à 2 par cycle de la culture	20 Jours	Pulvérisation foliaire Stade végétatif BBCH 20-39: de stade de 3 feuilles jusqu'au l'élongation de la tige .	-

N'appliquer pas après stade végétatif BBCH 39.

## Précautions d'emploi :

- Eviter le contact du produit avec la peau et les yeux.
- Ne pas avaler, et ne pas respirer les poussières.
- Porter des vêtements des gants et des lunettes de protection
- Ne pas manger, ni boire ou fumer pendant le traitement.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, dans un local fermé frais et aéré, loin des aliments y compris ceux pour animaux et hors de la portée des enfants.
- Changer de vêtement et laver le visage et les mains après application et avant de manger.
- En cas d'accident appeler rapidement le médecin et lui montrer l'étiquette ou le contenant si possible.

## PREMIERS SECOURS

- En cas de l'ingestion, appeler rapidement le médecin. N'administrez rien par voie orale. Maintenez le patient dans un repos pour conserver sa température corporelle. Contrôler la respiration, pratique la respiration artificielle si nécessaire.
- En cas de contact avec la peau et les yeux rincer abondamment à l'eau propre. Enlever les vêtements souillés.
- En cas d'inhalation, se placer dans un endroit frais et bien aéré.
- Transporter la victime à un centre Hospitalier. NE PAS LAISSER LA VICTIME SEULE EN AUCUN CAS.



## Herbicide sélectif



# سيكلوب®

كلودينفوب - بروبارجيل 95 غ/ل + كلوكينتوسات - مكسيل 25 غ/ل EC

## الخصائص:

سيكلوب مبيد عشبي انتقائي لمكافحة الأعشاب الطفيلية ذو الفلقة الواحدة في زراعات الحبوب. سيكلوب فعال ضد الأعشاب الحولية وهو سريع الامتصاص عن طريق الأوراق. ويعمل على منع تكوين الدهون المكون الأساسي لغشاء الأعشاب الطفيلية وهو ما ينتج عنه عرقلة نمو النباتات خاصة الحساسة منها خلال 48 ساعة من الاستخدام. تعتمد انتقائية الزراعة على قدرة النباتات على استقلاب المركب الأولي إلى الأحماض الحرة والمشتقات النشطة. يعمل المبيد بشكل أفضل ضد زراعة الأعشاب النشطة.

## الجرعة:

المحصول	الإفة	الجرعة	حجم الخليط
القمح	الأعشاب ذو الفلقة الواحدة	500 مل/هك	200-400 ل/هك
عدد المداواة	الفترة بين المداواة والآخرى	مرحلة المداواة	فترة الأمان
من 1 إلى 2 في الموسم الواحد.	20 يوم	استعمل على طريق الرش الورقي المرحلة: BBCH 20-39 من مرحلة 3 أوراق إلى استطالة الساق.	-

## احتياطات الاستعمال:

تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين. يجب ارتداء ملابس واقية وقفزات اثناء الرش. تجنب استنشاق رذاذ الرش و ابتلاع المسحوق. يمنع التدخين و الاكل و الشرب عند استعمال المبيد. يجب حفظ المبيد في عبوته الأصلية في مكان مغلق و جاف و مهواء و بعيدا عن المأكولات و الأعلاف و بعيدا عن تناول الأطفال. يجب تغيير الملابس و الإغتسال عند الانتهاء من الرش.

## الإسعافات الأولية:

في حالة تناول المبيد عن طريق الفم أو استنشاقه يجب الاتصال مباشرة بالطبيب. في حالة إصابة العين و تلوث الجلد يغسل جيدا بكمية كبيرة من الماء النظيف. عند الاستنشاق يحمل المصاب الي الهواء الطلق و استدعاء الطبيب في حالة صعوبة التنفس.

## شركة الخضراء

شارع الطيب المهيري 5000 المنستير  
الهاتف: 73 462 925 - 28 418 001  
الفاكس: 73 447 999 (216)  
E-mail: ste.khadra@topnet.tn  
site web: www.elkhadra.tn