



SINOCYPER®

Cypermethrine 250 G_r/L EC



→ DESCRIPTION :

Sinocyper est un insecticide de synthèse appartenant à la famille des pyrethrinoides (IRAC : 3A). Il est caractérisé par son efficacité contre une large gamme d'insectes nuisibles de type broyeur suceurs. Sinocyper agit avec des faibles doses et assure une protection de longue persistance.

→ TABLEAU D'USAGE :

Cultures	Parasites	Doses	D.A.R (Délai. Av .récolte)
C. maraîchères	Noctuelles défoliatrices	50CC/HL	3 Jours
Poirier	Psylle	50CC/HL	7 Jours
Arbres fruitiers	Scolytes	50CC/HL	
Oliviers	Dacus	30CC/HL	
Betterave à sucre	Casside	50CC/HL	3 Jours
Maïs	Pyrale, Sésamie	50CC/HL	3 Jours
Céréales	Pucerons, Altises, Tordeuse	50CC/HL	

→ MODE D'ACTION :

L'insecticide Sinocyper agit par contact et ingestion sur un grand nombre d'insectes à des doses très faibles. Il empêche la transmission des impulsions nerveuses le long du système nerveux des insectes cibles, en bloquant le canal sodium des membranes nerveuses. Son application permet une protection allant de 2 à 3 semaines même en conditions climatiques difficiles. Ce mode d'action est complété par un effet répulsif chez les adultes et un effet sur la nutrition des larves (inhibition de la ponte chez les adultes et de nourriture chez les larves).



→ CONDITIONS D'EMPLOI :

Quelle que soit la stratégie d'utilisation, il est recommandé d'employer **SINOCYPER** en alternance avec d'autres spécialités efficaces, de ne pas l'utiliser plus de 2 fois de suite et à moins de 7 jours d'intervalle, et de limiter son emploi à un maximum de 6 traitements par cycle de culture. Pour la **Casside de la betterave sucrière**: Raisonner les traitements suivant l'activité de la casside, au repérage de retour des adultes hivernants.

→ PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Le manipulateur de la spécialité **SINOCYPER** doit être obligatoirement muni de tous moyens de protection (gants, tenue de protection, visières, chaussures adéquates, casquettes, etc...) Eviter tout contact avec la peau et les yeux: produit irritant, tenir l'emballage bien fermé éviter l'exposition par inhalation et ne pas respirer le brouillard de pulvérisation: produit nocif par inhalation. Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de traitement et de manipulation dudit produit. Respecter les doses prescrites et les époques d'application.

Société El Khadra

Av.Taieb M'hiri 5000 Monastir
Tél: (216) 73 462 925 - 28 418 001

Fax: (216) 73 447 999

E-mail: ste.khadra@topnet.tn
site web: www.elkhadra.tn



SINOCYPER®

Cypermethrine 250 Gr/L EC



→ DESCRIPTION :

Sinocyper est un insecticide de synthèse appartenant à la famille des pyrethrinoides (IRAC : 3A). Il est caractérisé par son efficacité contre une large gamme d'insectes nuisibles de type broyeur suceurs. Sinocyper agit avec des faibles doses et assure une protection de longue persistance.

→ TABLEAU D'USAGE :

Cultures	Parasites	Doses	D.A.R (Délai. Av .récolte)
C. maraîchères	Noctuelles défoliatrices	50CC/HL	3 Jours
Poirier	Psylle		
Arbres fruitiers	Scolytes	50CC/HL	7 Jours
Oliviers	Dacus	30CC/HL	
Betterave à sucre	Casside	50CC/HL	3 Jours
Maïs	Pyrale, Sésamie		
Céréales	Pucerons, Altises, Tordeuse		

→ MODE D'ACTION :

L'insecticide Sinocyper agit par contact et ingestion sur un grand nombre d'insectes à des doses très faibles. Il empêche la transmission des impulsions nerveuses le long du système nerveux des insectes cibles, en bloquant le canal sodium des membranes nerveuses. Son application permet une protection allant de 2 à 3 semaines même en conditions climatiques difficiles. Ce mode d'action est complété par un effet répulsif chez les adultes et un effet sur la nutrition des larves (inhibition de la ponte chez les adultes et de nourriture chez les larves).



→ CONDITIONS D'EMPLOI :

Quelle que soit la stratégie d'utilisation, il est recommandé d'employer **SINOCYPER** en alternance avec d'autres spécialités efficaces, de ne pas l'utiliser plus de 2 fois de suite et à moins de 7 jours d'intervalle, et de limiter son emploi à un maximum de 6 traitements par cycle de culture. Pour la **Casside de la betterave sucrière**: Raisonner les traitements suivant l'activité de la casside, au repérage de retour des adultes hivernants.

→ PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Le manipulateur de la spécialité **SINOCYPER** doit être obligatoirement muni de tous moyens de protection (gants, tenue de protection, visières, chaussures adéquates, casquettes, etc...) Eviter tout contact avec la peau et les yeux: produit irritant, tenir l'emballage bien fermé éviter l'exposition par inhalation et ne pas respirer le brouillard de pulvérisation: produit nocif par inhalation. Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de traitement et de manipulation dudit produit. Respecter les doses prescrites et les époques d'application.

