



CYCLO[®] R LIQUIDE

Metalaxyl 45 g/l + Hydroxyde de Cuivre 237.7 g/l SC



→ DESCRIPTION :

CYCLO R LIQUIDE est l'association de deux fongicides, un systémique (**métalaxyl**) et l'autre de contact (**cuivre**), aux propriétés curatives et préventives. Il interfère dans la synthèse des protéines fongiques, empêchant le développement du mycélium et la production de spores.

Stimule indirectement la production d'une enzyme dans la plante qui empêche la pénétration des cellules fongiques permettant ainsi le contrôle de la moisissure dans différentes cultures telles que Tomate, Pomme de terre, vigne et Fraises.

→ TABLEAU D'USAGE :

Cultures	Maladies	Doses
Solanacées (P.de terre, Tomate)	Mildiou (Phytophthora infestans) Bacteriose, Alternariose	250cc/hl
Vignes	Mildiou, Black rot	250cc/hl
Fraises	Phytophthora	250cc/hl

Les traitements répétés peuvent provoquer le développement de souches résistantes de champignons. Il est donc recommandé d'alterner les traitements avec d'autres fongicides classiques..

Précautions d'emploi :

- P262: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- P273: Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391: Recueillir le produit répandu.
- P501: Disposer du contenu conformément à la réglementation locale.

Premiers secours :

En cas de l'ingestion, appeler rapidement le médecin. N'administrer rien par une voie orale.

Maintenir le patient dans un repos. Afin de conserver sa température corporelle stable Contrôler la respiration, pratiquer la respiration artificielle si nécessaire. En cas de contact avec la peau et les yeux rincer abondamment à l'eau propre. Enlever les vêtements souillés.

En cas d'inhalation, se placer dans un endroit frais et bien aéré. Transporter la victime à un Centre Hospitalier.

Société El Khadra

Av.Taieb M'hiri 5000 Monastir
Tél: (216) 73 462 925 - 28 418 001
Fax: (216) 73 447 999
E-mail: ste.khadra@topnet.tn
site web: www.elkhadra.tn

سيكلو® ر ليكيد



ميالكسيل 45 غ/ل + النحاس 237.7 غ/ل SC


الخصائص:

سيكلو - ر- ليكيد هو مبيد فطري ذو فاعلية مزدوجة: جهازي (ميالكسيل) و بالملامسة (النحاس)، حيث تعمل المادتان على حماية النبتة و علاجها من خلال عرقلة تكون الفطريات و منع انتشارها.

كما يساهم هذا المبيد بطريقة غير مباشرة في تنشيط افراز النبتة لانزيمات تمنع دخول الفطريات لمختلف خلايا النباتات مثل الطماطم البطاطا العنب و الفروالة .

الاستعمالات والجرعات:

الجرعة	الآفة	الزراعات
250 مل/هل	الملديو البكتريوز الترنريوز	البطاطا و الطماطم
250 مل/هل	الملديو بلاكروت	العنب
250 مل/هل	الفيتوفتورا	الفروالة

Alternariose (*Alternaria solani*)

احتياطات الاستعمال:

تجنب ملامس المبيد للجلد أو للعين
يجب ارتداء ملابس واقية وقفزات أثناء الرش
يجب تغيير الملابس والاغتسال عند الانتهاء من الرش
تجنب استنشاق رذاذ الرش وابتلاع المسحوق
يمنع التدخين والأكل والشرب عند استعمال المبيد



symptômes sur feuille de tomate

symptômes sur tige de tomate

الإسعافات الأولية:

*في حالة تناوله عن طريق الفم، يرجى الاتصال بالطبيب فوراً وعدم تناول أي شيء عن طريق الفم.

*إبقاء المريض على الراحة التامة للحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة.

*إذا فقد المصاب الوعي، الإبقاء عليه على أحد جانبيه مع خفض رأسه في مستوى أقل من الجسم وأن تكون الركبتين شبه مثبتيين.

*مراقبة التنفس واللجوء إلى التنفس الاصطناعي إذا لزم الأمر.

*نقل المريض إلى مركز علاجي وعدم ترك المصاب وحده في حال من الأحوال.

*في حالة ملامسة المبيد للجلد والعينين، يتم غسلهم بكمية كبيرة من الماء.

*خلع الملابس الملوثة بعد استعمال المبيد.

*في حالة استنشاق رذاذ المبيد أو مسحوقه، الذهاب إلى مكان مفتوح وجيد التهوية.