PESTICIDES

Insecticide / Acaricide

Elkhadra

فالماك® EC

أبامكتين 18 غ/ل

الخاصيات و طرق الفاعلية

فالماك مبيد حشري و عناكبي متكون من **18** غ/ل من المادة الفعالة **أبامكتين** التي تمتاز بنجاعتها الفائقة ضد جميع الأطوار المتحركة للعديد من الحشرات والعناكب **فالماك** يعمل باللمس و الهضم و يمتاز بخاصيته النافذة. للحصول على نتائج المداواة يجب الانتظار من ثلاثة الى خمس أيام بعد المداواة مباشرة تنقص الحشرات والعناكب من الاستهلاك بصفة ملحوظة وبذلك تنقص المضرة على النباتات. **فالماك** يتسرب داخل النباتات بصيغته النافذة و يحمي الأوراق من الجهتين يجب التدخل **بالفالماك** منذ الكشف الأولي على وجود الحشرات أو العناكب المراد مداواتها (خمس حشرات/ ورقة إلى**75** %) من الإصابة من المستحسن التدخل **بالفالماك** بعد **2** إلى **3** أسابيع من المداواة الأولى. بالنسبة للقوارص يمكن مزج المبيد **فالماك** بالزيت الصيفي لإضفاء نجاعة قصوى على حافرة الأوراق التي تصيب هذه الزراعات.

الاستعمال و الجرعة

الزراعة	الأفة	الجرعة	حجم الخليط ل/هك	عدد المداواة	الفترة بين مداواة واخرى
القوارص	حافرة الأوراق	40 مل+400 مل/هل زيت صيفي	2000 - 1000	2	7 أيام
	العناكب	60 مل/هل			
الخضروات تحت البيوت المحمية: (الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الفقوس	العناكب التريبس	100-75 مل /هل			
	حافرة الأوراق	50-30 مل /هل	800 - 1000		
أشجار التفاح والاجاص	البسيل	100-75 مل /هل	2000 - 1000	1 / عام	
الفراولة	العناكب	100-75 مل /هل	1000	2-1	
الخس، البصل والثوم	حافرة الأوراق، التريبس	100-50 مل /هل	2000 - 1000	2-1	7 أيام
نباتات الزينة	حافرة الأوراق	100-50 مل /هل			
	العناكب، التريبس الذبابة البيضاء	100-75 مل /هل			
النخيل	بوفروة	100-75 مل /هل	2000 - 1000		

VALMEC® EC
INSECTICIDE ACARICIDE par contact et ingestion sous forme de concentré émulsionnable (EC)
مبيد حشري و عناكبي يعمل باللمس و الهضم على شكل مستحلب مركز
Substance active : Abamectine 18 g/L EC
مادة فعالة: أبامكتين
Homologation n° : I.004-19
رخصة عدد:
Lot N° :
Date Fab. :
Voir sur l'emballage
انظر على العبوة
الدفعة عدد:
تاريخ الصنع:
Enregistré et distribué en Tunisie par :
SOCIETE EL KHADRA
Av.Taieb M'hiri 5000 Monastir
Tél: (216) 73 462 925 - 28 418 001
Fax: (216) 73 447 999
E-mail: ste.khadra@topnet.tn
Site web: www.elkhadra.tn
ALBAUGH your alternative
Fabriqué par: ALBAUGH Europe Sàrl, World Trade Center Lausanne, Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, Switzerland
Tel: +41 21 799 9130
Fax: +41 21 799 9139
Email: sds@albaugh.eu
Web: www.albaugh.eu
1L
® ™ trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company

شـركة الخضـراء

شارع الطيب المهيري5000 المنستير
الهاتف: 001 418 28 - 925 462 73
الفاكس: 999 447 73 (216)
site web: www.elkhadra.tn
E-mail: ste.khadra@topnet.tn

ALBAUGH
your alternative

PESTICIDES

Insecticide / Acaricide

VALMEC® EC

Elkhadra

ABAMECTINE 18 g/l EC

PROPRIETES:

VALMEC EC est un insecticide - acaricide à base de 18gr/l d'Abamectine qui est une substance active produite à la suite de la fermentation d'un micro-organisme vivant dans le sol. Elle est enrichie en huile pour faciliter la pénétration dans la plante.
VALMEC EC manifeste un haut niveau d'efficacité, spécialement contre Mouche mineuse, Thrips, Psylle et tout types d'Acariens.
Il agit par ingestion et dans une moindre mesure par contact sur les formes mobiles d'acariens et insectes piqueurs, suceurs et broyeurs.
C'est un produit translaminaire (pénétrant), ce qui veut dire que **VALMEC** pénètre dans la feuille sur laquelle il a été appliqué. Il y reste stocké et la protège contre les ravageurs piqueurs et broyeurs, ce qui confère au produit une longue durée d'action (3 à 4 semaines).

MODE D'ACTION DE L'ABAMECTINE:

L'Abamectine agit en empêchant la transmission de l'influx nerveux des nerfs aux muscles.(Synapse GABA)

L'Abamectine agit en paralysant rapidement les ravageurs, ceux-ci cessent de se nourrir et meurent après 3-4 jours.

L'Abamectine peut contrôler les ravageurs résistants aux autres familles chimiques.

Sur agrumes contre Mineuses des feuilles, il est recommandé de le mélanger avec un huile d'été (PLANT OIL) .

Contre quels ravageurs on utilise VALMEC:

VALMEC EC est doté de propriétés acaricides et insecticides. Il est utilisé surtout pour lutter contre les Acariens, les Thrips, les Psylles et les Mouches mineuses des feuilles sur les principales cultures légumières : Tomate, Aubergine, Courge, Melon, piment...

TABLEAU D'USAGE :

Cultures	Ravageurs	Doses	Volume bouillie (L/Ha)	Nbres applications
Agrumes	Mineuse des feuilles	40cc + 400cc/hl d'huile d'été	1000-2000L	2
	Acariens	60cc/hl		
Cultures sous serres (tomate, piment, aubergine concombre)	Acariens, Tarsonème Thrips	75 - 100cc/hl		
	Mouche mineuse	30 - 50cc/hl	800-1000L	
Pommier,Poirier	Psylle	75 - 100cc/hl	1000-2000L	1/ans
Fraisier	Acariens, Tarsonème	75 - 100cc/hl	1000L	1 - 2
Laitue, Oignon Aïl	Mouche mineuse Thrips	50 - 100cc/hl	1000-2000L	1 - 2
Cultures ornementales	Mouche mineuse	50 - 75cc/hl		
	Acariens, Thrips Mouche blanche	75 - 100cc/hl		
Palmier dattier	Acariens (Boufaroua)	75 - 100cc/hl	1000L	1 - 2

ALBAUGH®
your alternative

Société El Khadra
Av.Taieb M'hiri 5000 Monastir
Tél: (216) 73 462 925 - 28 418 001
Fax: (216) 73 447 999
E-mail: ste.khadra@topnet.tn
site web: www.elkhadra.tn