PESTICIDES

Fongicides

CYCLO MAX™ SC

Metalaxyl - M 28.5g/l + Hydroxyde de Cuivre 215 g/l SC

Caractéristiques :

Cyclo max est un fongicide composé de 28.5 g/l de Metalaxyl-M et de 215 g/l d'Hydroxyde de Cuivre sous forme de suspension concentrée. L'association de ces deux substances actives dont une systémique (métalaxyl-M) et une de contact (cuivre) confère au produit des propriétés à la fois préventives et curatives .

Mode d'action :

Cyclo max interfère avec la synthèse des protéines fongiques, empêchant ainsi le développement du mycélium et la production de spores. Il stimule indirectement la production d'une enzyme dans la plante qui empêche la pénétration des cellules fongiques, permettant de contrôler le mildiou dans différentes cultures (Tomate, Pomme de terre, vigne et Fraises).

Metalaxyl-M:

Cette substance active appartenant au groupe des Acylalanines (FRAC : 4) agit principalement sur les champignons du groupe des Oomycètes (Pythium, Phytophtora, Plasmopora, Peronospora). Metalaxyl-M pénètre rapidement dans la plante et s'y diffuse par voie ascendante.

Hydroxyde de Cuivre:

Cette substance présente un mode d'action de contact multi-sites. Elle appartient au groupe des substances inorganiques (FRAC : M 01) et présente un effet préventif.

Tableau d'usage :

Cultures	Maladies	Doses	DAR (jours)
Cultures maraichères Cucurbitacées	Mildiou de cuba Pythium	300 cc/hl	3
Pomme de terre	Mildiou		21
Vignes	Mildiou, Black rot		3
Fraisiers	Phytophtora		3



Notes importantes:

Aubergine : Utilisation en extérieur et en serre. Appliquer à partir de 9 pousses ou plus apicales latérales visibles (BBCH 29) jusqu'au début de la maturation des fruits et des graines (BBCH 81). Pomme de terre : Appliquer à partir de 60 % des plants se touchant entre les rangs (BBCH 36) jusqu'au début de la maturation des fruits et des graines (BBCH 81). Tomate : Appliquer à partir de 9 pousses apicales latérales visibles ou plus (BBCH 29) jusqu'au début de la maturation des fruits et des graines (BBCH 81). Période de sécurité dans l'usine TOMATO/ AUBERG : 3 jours (en plein air)/10 jours (serre).

Société El Khadra

Av.Taieb M'hiri 5000 Monastir
Tél: (216) 73 462 925 - 28 418 001
Fax: (216) 73 447 999
E-mail: ste.khadra@topnet.tn
site web: www.elkhadra.tn

ALBAUGH your alternative

سيكلوماكس SC™

ميتالاكسيل-إم 28.5 غ/ل + هيدروكسيد النحاس 215 غ/ل SC

الخصائص:

سيكلو ماكس هو مبيد فطري يتكون من 28.5 غ/ل من ميتالاكسيل-إم و215 غ/ل من هيدروكسيد النحاس على شكل معلق مركز إن الجمع بين هاتين المادتين الفعالتين، واحدة جهازية و الأخرى بالملامسة (النحاس) يعطي المبيد خصائص وقائية وعلاجية

طريقة العمل:

يؤثر **سيكلو ماكس** على تكوين البروتينات الفطرية، وبالتالي يمنع تطور الميسليوم وإنتاج الفطريات يحفز بشكل غير مباشر إنتاج إنزيم في النبات يمنع تغلغل الخلايا الفطرية، مما يجعل من الممكن مكافحة الميلديو في مختلف المحاصيل :الطماطم، البطاطا والكروم والفراولة .

ميتالاكسيل-إم

تنتمي هذه المادة الفعالة إلى مجموعة Acylalanines (FRAC: 4) وتعمل بشكل رئيسي على الفطريات من مجموعة Oomycetes (Pythium، Phytophthora، Plasmopora ، Peronospora)

كما يتميز بطريقة عمل تصاعدية

هيدروكسيد النحاس

تعمل هذه المادة الفعالة بالملامسة في عديد المواقع. وهي تنتمي إلى مجموعة المواد غير العضوية (FRAC: M 01). ولها تأثير وقائي .

الجرعة والاستعمال :

المحصول	الأفات	الجرعة	فترة الامان
الخضروات القرعيات	الميلديو البتيوم	300 مل/هل	3
البطاطا	الميلديو		21
العنب	الميلديو، العفن الاسود		3
الفراولة	الفيتوفتورا		



شـــركة الخضـــراء
شارع الطيب المهيري5000 المنستير
الهاتف: 001 418 28 - 925 462 73
الفاكس: 999 447 73 (216)
E-mail: ste.khadra@topnet.tn
site web: www.elkhadra.tn

ALBAUGH your alternative